



**Gebrauchsinformation**  
bitte sorgfältig lesen!

# Ratanhia comp.

## Lösung

### Zusammensetzung

10 g (= 11,1 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Myrrhae tinctura 4 g / Ratanhiae radix extractum fluidum (Droge zu Extrakt = 1:1; Auszugsmittel Ethanol 43 Gew.-%) 1,158 g / Aesculus, Cortex, ethanol. Decoctum Dil. D19 0,1 g / Argentum nitricum Dil. D14 (ab D7 mit Ethanol 15 Gew.-%) 0,1 g / Fluorit Dil. D9 (ab D8 mit Ethanol 15 Gew.-%) 0,1 g / Kieserit Dil. D19 0,1 g / Caryophylli floris aetheroleum 0,004 g / Eucalypti aetheroleum 0,01 g / Lavandulae aetheroleum 0,007 g / Menthae piperitae aetheroleum 0,035 g / Salviae officinalis aetheroleum 0,005 g.  
Sonstige Bestandteile: Ethanol 96%, Gereinigtes Wasser.

### Darreichungsform und Packungsgröße

20 ml Lösung

### Anthroposophisches Arzneimittel

**Weleda AG**

**Postfach 1309/1320**

**D-73503 Schwäbisch Gmünd**

### Anwendungsgebiete

gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis  
Dazu gehören: Durchgestaltung überschießender Stoffwechselprozesse von Zahnfleisch und Mundschleimhaut, z.B. entzündliche Veränderungen, Druckstellen und Blutungsneigung, Aphthen.

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden.

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Ratanhia comp. nicht anwenden?*

Ratanhia comp. soll nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Ratanhia comp. soll bei Kindern unter 2 Jahren nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Wie alle Arzneimittel sollte Ratanhia comp. in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt



## Hinweis

Ratanhia comp. enthält 69 Vol.-% Alkohol.

## Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, mehrmals täglich ca. 15 Tropfen auf ein halbes Glas Wasser geben und zu Mundbädern verwenden.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren können auch mehrmals täglich mit der unverdünnten Ratanhia comp. Lösung das Zahnfleisch massieren.

*Zur Anwendung in der zahnärztlichen Praxis:*

Ratanhia comp. wird auf die erkrankten Schleimhautbezirke aufgetragen. Zur längeren intensiven Einwirkung werden mit der Lösung getränkte Auflagen verwendet.

*Hinweise:*

Der Kontakt von Ratanhia comp. mit den Augen muss in jedem Fall vermieden werden.

Eine eventuelle Trübung der Flüssigkeit ist für Wirksamkeit und Verträglichkeit ohne Belang. Um eine gleichmäßige Verteilung bei der Entnahme zu gewährleisten, sollte die Flasche vor Gebrauch geschüttelt werden.

## Dauer der Anwendung

Die Behandlung bei akuten Entzündungen sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieses Zeitraumes keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen.

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

## Nebenwirkungen

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

## Hinweis

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Stand der Information:** September 2005

